

## Intranet – Traitement IMUREL

### Indications principales en Médecine Interne :

- Vascularites : traitement d'entretien
- Lupus érythémateux systémique
- Syndrome de Gougerot-Sjögren avec atteintes viscérales
- Polychondrite atrophiante
- Hépatites auto-immunes
- Myasthénie
- Maladie de Behçet compliquée...

### Posologie :

- Comprimés de 25 et 50 mg
- Per os
- 2 mg/kg/j en 1 à 3 prises, au moment des repas

### Principales interactions médicamenteuses :

- Zyloric® (Allopurinol) : augmente la toxicité de l'Imurel

### Principaux effets secondaires :

- Hématologiques : fréquents (3 lignées)
- Hypersensibilité : rare (hyperthermie, hypotension, oligurie, rash)
- Digestifs : fréquents, modérés
- Hépatites et pancréatites : rares

### Contre-indications :

- Hypersensibilité
- Anomalies hématologiques
- Infection en cours (arrêt momentané du traitement)

### Précautions d'emploi :

- Adaptation des doses en cas de cytopénie, d'insuffisance rénale ou hépatique

### **Surveillance :**

- NFS, bilan hépatique, lipase : 1/semaine pendant 1 mois puis 2/mois les 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> mois puis tous les mois
- Surveillance clinique